

## ИНСТРУКЦИЯ

по ветеринарному применению лекарственного препарата Дронтал® плюс.

(Организация-разработчик: компания «Bayer Animal Health GmbH»  
Kaiser-Wilhelm-Allee 10, D-51373 Leverkusen, Германия)

Номер регистрационного удостоверения: 276-3-21.13-3032 СТВУ-3-0.2/04478

### I. Общие сведения

1. Наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения:  
торговое наименование: Дронтал® плюс (Drontal® plus).

Международные непатентованные наименования действующих веществ:  
пирантел, празиквантел, фебантел.

2. Лекарственная форма: таблетки для орального применения.

Лекарственный препарат Дронтал® плюс выпускают в двух дозировках, содержащих в качестве действующих веществ в 1 таблетке, рассчитанной на 10 кг массы животного: пирантел эмбонат - 144 мг, празиквантел - 50 мг и фебантел - 150 мг, в 1 таблетке, рассчитанной на 35 кг массы животного: пирантел эмбонат - 504 мг, празиквантел - 175 мг и фебантел - 525 мг, а также вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, микрокристаллическую целлюлозу, крахмал кукурузный, поливидон, магния стеарат, натрия лаурилсульфат, кроскармеллозу натрия, кремний коллоидный безводный и пищевую добавку со вкусом мяса.

3. По внешнему виду Дронтал® плюс 1 таблетка на 10 кг представляет собой таблетку в форме кости от светло-коричневого до темно-коричневого цвета с разделительной бороздкой по центру.

По внешнему виду Дронтал® плюс 1 таблетка на 35 кг представляет собой таблетку в форме кости от светло-коричневого до темно-коричневого цвета с разделительной бороздкой по центру.

Срок годности препарата при соблюдении условий хранения – 5 лет со дня производства. Запрещается применение препарата Дронтал® плюс по истечении срока годности.

4. Таблетки Дронтал® плюс фасуют в блистеры по 2 и 6 таблеток, которые упаковывают в картонные пачки вместе с инструкцией по применению.

5. Хранят Дронтал® плюс в закрытой упаковке производителя в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 0°С до 25°С.

6. Препарат Дронтал® плюс следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Отпускается без рецепта ветеринарного врача.

## II. Фармакологические свойства

9. Дронтал® плюс относится к фармакотерапевтической группе антигельминтных препаратов в комбинациях.

10. Дронтал® плюс обладает широким спектром антигельминтного действия в отношении круглых, ленточных гельминтов и простейших рода лямблий, паразитирующих у собак, включая *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina*, *Uncinaria stenocephala*, *Ancylostoma caninum*, *Trihuris vulpis*, *Echinococcus multilocularis*, *Echinococcus granulosus*, *Taenia spp.*, *Dipylidium caninum*, *Multiceps multiceps*, *Mesocestoides spp.*, *Giardia spp.*

Механизм действия фебантела, входящего в состав лекарственного препарата, основан на нарушении транспорта глюкозы и микротубулярной функции паразита, ингибировании фумаратредуктазы и синтеза АТФ, повышении проницаемости клеточных мембран, что приводит к нарушению мышечной иннервации, параличу, гибели паразита и способствует его элиминации из желудочно-кишечного тракта.

Пирантела эмбонат оказывает выраженное нематодоцидное действие, вызывая повышение проницаемости клеточных мембран, необратимый паралич и контрактуру мышц у нематод, что приводит к гибели паразита и способствует его элиминации из желудочно-кишечного тракта. Пирантела эмбонат и фебантел частично всасываются в кишечнике и выводятся из организма в основном с фекалиями в течение 24-48 часов.

Механизм действия празиквантела заключается в деполяризации нейромышечных ганглиоблокаторов, нарушении транспорта глюкозы и микротубулярной функции у цестод, что приводит к нарушению мышечной иннервации, параличу и гибели паразита. Празиквантел быстро всасывается в кишечнике и

распределяется во внутренних органах и тканях; выводится из организма с мочой в основном в метаболизированной форме.

Дронтал® плюс по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах не оказывает эмбриотоксического, тератогенного и сенсibiliзирующего действия. Хорошо переносится собаками разных пород и возрастов.

### III. Порядок применения

11. Дронтал® плюс назначают собакам с профилактической и лечебной целью при нематодозах (токсокароз, токсамаскаридоз, унцинариоз, анкилостомоз, трихоцефалез) и цестодозах (тениидозы, дипилидиоз, эхинококкозы, мезоцестидоз) и гиардиозе (лямблиозе).

12. Противопоказанием к применению препарата Дронтал® плюс является индивидуальная повышенная чувствительность животного к компонентам препарата (в том числе в анамнезе). Не следует применять препарат животным массой менее 2 кг.

13. При работе с препаратом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. По окончании работы следует тщательно вымыть руки теплой водой с мылом. Во время работы с препаратом не разрешается курить, пить и принимать пищу. Пустые блистеры и коробки из-под препарата утилизируют с бытовыми отходами.

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз их необходимо немедленно промыть большим количеством проточной воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с лекарственным препаратом Дронтал® плюс. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

14. Дронтал® плюс не следует назначать щенным сукам первые две трети периода беременности и щенкам моложе 2-х недельного возраста. Препарат разрешен к применению в период лактации.

15. Дронтал® плюс применяют собакам индивидуально однократно из расчета 1 таблетка в форме кости на 10 кг массы животного или 1 таблетка в форме кости на 35 кг массы животного. Дозы препарата указаны в таблице:

Масса собаки	Дозировка препарата Дронтал® плюс
	1 таблетка на 10 кг

19. Особенностей действия лекарственного препарата при его первом применении и отмене не выявлено.

20. Следует избегать нарушений рекомендуемых сроков дегельминтизации. При пропуске очередной обработки лекарственный препарат необходимо ввести как можно скорее в предусмотренной данной инструкцией дозе.

21. Дронтал® плюс не предназначен для применения продуктивным животным.

Наименования и адреса производственных площадок производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения.

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH; Projensdorfer Str. 324, D-24106 Kiel (Germany).

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя.

АО «БАЙЕР»  
Москва, 107113, 3-я Рыбинская ул.,  
18, стр. 2;  
тел. (495) 234-2000

С согласованием настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению препарата Дронтал® плюс утвержденная Россельхознадзором 20.03.2018 года.